

CABRIO® DUO

Fungicida
Concentrato Emulsionabile (EC)

CABRIO® DUO

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

PYRACLOSTROBIN puro g 3,8 (=40 g/l)

DIMETOMORF puro g 6,9 (=72 g/l)

Coformulanti q. b. a g 100

Contiene: alcool benzilico, nafta solvente

INDICAZIONI DI PERICOLO

H315 Provoca irritazione cutanea. H304 Può essere mortale in caso di ingestione e

di penetrazione nelle vie respiratorie. H360F Può nuocere alla fertilità. H302+H332 Nocivo se ingerito o se inalato. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P260 Non respirare la nebbia o i vapori. P264 Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P330 Sciacquare la bocca. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P332+P313 In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. P331 NON provocare il vomito. P362+P364 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

**BASF Italia S.p.A. - Via Marconato, 8
20811 Cesano Maderno (MB) Tel. 0362/512.1**

Officine di produzione

BASF SE, Ludwigshafen, Germania

BASF Espanola S.A. - Tarragona, Spagna

BASF AGRI-Production S.A.S., Genay, Francia

Officine di rietichettatura:

Ita.Fer.T Snc - Canale (CN)

C.D.M. S.r.l. - Soluzioni logistiche, Cimadolmo - Treviso

PRODOTTO FITOSANITARIO

**Reg. del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
n. 13126 del 21/05/09**

Contenuto netto: 1 - 2,5 - 4 - 5 - 10 l

Partita n.

* Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattati di associazione delle seguenti sostanze attive: PYRACLOSTROBIN 4% e DIMETOMORF 7,2% le quali,

separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **DIMETOMORF:** Terapia sintomatica. **PYRACLOSTROBIN:** Terapia sintomatica. **Consultare un centro antiveleni**

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

Rischi particolari: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali (per tutti gli impieghi in pieno campo).

CARATTERISTICHE TECNICHE: Cabrio Duo contiene le sostanze attive pyraclostrobin e dimetomorf le quali appartengono a due famiglie chimiche distinte e presentano un diverso meccanismo d'azione. Cabrio Duo è prevalentemente indicato per il controllo di peronospora ed alternariosi delle colture da orto autorizzate.

CAMPI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti (vedi tabella):

Coltura	Malattia	Dose ml/hl	Dose l/ha	Intervallo tra i tratt. (giorni)	N° massimo tratt. all'anno
Pomodoro in pieno campo e serra	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>), alternariosi (<i>Alternaria solani</i>)	200-250	2 - 2,5	7-10	3
Patata in pieno campo	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>), alternariosi (<i>Alternaria solani</i>)	200-250	2 - 2,5	7-10	3
Cetriolo, cetriolino e zucchini in pieno campo e serra	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	200-250	2 - 2,5	7-10	3
Cetriolo, cetriolino e zucchini (in serra)	Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	250	2,5	7-8	3
Melone in pieno campo	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), alternariosi (<i>Alternaria cucumerina</i> , <i>Alternaria alternata</i> , <i>Alternaria</i> spp.),	200-250	2 - 2,5	7-10	3
Lattuga (<i>Lactuca sativa</i>) incluso Lattuga baby leaf in pieno campo e serra	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	200	2	7-10	3
Cipolla e scalogno in pieno campo	Peronospora (<i>Peronospora destructor</i>)	200-250	2 - 2,5	7-10	3
Aglio in pieno campo	Peronospora (<i>Peronospora destructor</i>) Ruggine (<i>Puccinia Allii</i>)	200-250	2 - 2,5	7-10	3
Porro in pieno campo	Peronospora (<i>Phytophthora porri</i>)	200-250	2 - 2,5	7-10	3
Erbe fresche in pieno campo	Peronospora (<i>Peronospora</i> spp.)	200-250	2 - 2,5	7-10	3
Spinaci, bietola da foglia e da costa in pieno campo	Peronospora (<i>Peronospora</i> spp.)	200-250	2 - 2,5	7-10	3
Carciofo pieno campo	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>) Ascochitosi (<i>Ascochyta hortorum</i>) Oidio (<i>Leveillula taurica</i>)	250	2,5	7-10	3
Melanzana pieno campo e serra	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>), Oidio (<i>Leveillula taurica</i>)	250	2,5	7-10	3

Cabrio Duo possiede anche un effetto collaterale contro il cancro gommoso delle cucurbitacee (*Didymella bryoniae*).

► Non applicare Cabrio Duo più di 2 volte consecutive e per un massimo di 3 trattamenti all'anno. ► Trattare con volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Con volumi d'acqua inferiori a 1.000 L/ha (per es. basso volume), fare riferimento alla dose ad ettaro, da intendersi come dose minima; con volumi superiori a 1.000 L/ha, fare riferimento alla dose per ettolitro. ► Cabrio Duo va applicato preventivamente. ► Si consiglia di usare Cabrio Duo nei periodi critici di sviluppo delle sopraelencate malattie delle colture. ► Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione è necessario impiegare la dose più alta e l'intervallo più breve tra i trattamenti. ► Si consiglia l'impiego di Cabrio Duo nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: 1) Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. 2) Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. 3) Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. 4) Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione. 5) Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua.

FITOTOSSICITÀ: Cabrio Duo, su lattuga varietà Trocadero, nei primi giorni dopo il trattamento potrebbe manifestare fenomeni di decolorazione parziale della foglia che scompaiono nei giorni a seguire. Effettuare saggi preliminari.

COMPATIBILITÀ: In caso di miscela con altri prodotti, è buona prassi effettuare saggi preliminari su un numero limitato di piante, prima di estendere i trattamenti a tutta la coltura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO e SPINACI, BIETOLA DA FOGLIA E DA COSTA; 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER PORRO, ERBE FRESCHE e LATTUGA BABY LEAF; 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LE ALTRE COLTURE.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non venderci sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 09.11.2015 e modificata ai sensi dell'art.7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 03.09.2022