

# KASKO MET

Fungicida specifico per la lotta contro la Peronospora della vite, degli agrumi, della fragola e delle colture orticole

(POLVERE BAGNABILE)

MECCANISMO D'AZIONE: CODICE 4 (FRAC)

KASKO MET - Registrazione Ministero della Salute n. 18109 del 13/09/2022

## COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

METALAXIL, puro	g. 25
Coformulanti q.b. a	g.100

## IQV ITALIA S.r.l.

Via Carlo Dell'Acqua, 7 - 20027 Rescaldina (MI)

Tel 0331 745784

Stabilimenti di produzione:

Industrias Químicas del Vallés, S.A. - Mollet del Vallés, Barcelona (Spagna)

Industrias Químicas del Vallés, S.A. - Cheste, Valencia (Spagna)

Distribuito da:

GOWAN ITALIA S.r.l. - via Morgagni 68, 48018, Faenza (RA) - Tel. +39 0546/629911

Partita n.

Contenuto: g 250-500 Kg 1-4-5-10-15-20

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H302 Nocivo se ingerito. H319 Provoca grave irritazione oculare. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H335 Può irritare le vie respiratorie. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261: Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/protezioni respiratorie/ Proteggere gli occhi/il viso. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale



**ATTENZIONE**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Durante le operazioni di preparazione della miscela indossare guanti protettivi, indumenti da lavoro, protezioni per gli occhi e protezioni respiratorie FFPP2. Durante l'applicazione tramite trattore, usare indumenti da lavoro. Durante l'applicazione manuale usare indumenti da lavoro e guanti. In caso di necessità di rientrare nell'area trattata per operazioni di mantenimento, usare indumenti da lavoro e guanti. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. In caso di inalazione, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone. **SP1: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.**

## INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrare l'etichetta).

**Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.**

## CARATTERISTICHE

KASKO MET è un fungicida sistemico ad azione preventiva efficace nei confronti delle peronosporacee e di altre avversità delle colture. La sua spiccata sistemica consente la protezione anche della vegetazione sviluppatasi successivamente all'evento infettivo.

## DOSIEMODALITÀ D'IMPIEGO

**VITE:** contro Peronospora (*Plasmopara viticola*) impiegare 80-200 g/hL in 400-1000 litri di acqua (0,8 kg/ha), effettuando fino a un massimo di 3 trattamenti per stagione a partire dall'epoca di pre-fioritura, distanziandoli non meno di 10 e non più di 14 giorni l'uno dall'altro.

**AGRUMI (Arancio, Pompelmo):** contro Fitoftora (*Phytophthora* spp.) per applicazioni fogliari impiegare 40-80 g/hL in 1000-2000 litri di acqua (0,8 kg/ha), per applicazioni con impianti di irrigazione a goccia distribuire in totale 1,5 kg/ha di prodotto. In entrambi i casi effettuare fino a un massimo di 3 trattamenti per stagione dallo sviluppo della nuova vegetazione e fino alla completa colorazione dei frutti. Non distanziare i trattamenti tra loro meno di 10 o più di 14 giorni.

**FRAGOLA in serra:** contro Marciume del colletto (*Phytophthora* spp.) somministrazioni tramite irrigatori a goccia in totale 1,5 kg/ha di prodotto a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino a 3 settimane prima della raccolta. Non effettuare più di 3 applicazioni per stagione e non distanziare i trattamenti tra loro meno di 10 o più di 14 giorni.

**POMODORO in campo e in serra:** contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), *Alternaria* (*Alternaria solani*) impiegare 80-200 g/hL in 400-1000 litri di acqua (0,8 kg/ha), effettuando fino a un massimo di 3 trattamenti per stagione a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino alla pre-maturazione dei frutti. Non distanziare i trattamenti tra loro meno di 10 o più di 14 giorni.

**PEPERONE in serra:** in somministrazioni tramite irrigatori a goccia distribuire in totale 1,5 kg/ha di prodotto a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino a 3 settimane prima della raccolta. Non effettuare più di 3 applicazioni per stagione e non distanziare i trattamenti tra loro meno di 10 o più di 14 giorni.

**PATATA:** contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), impiegare 80-200 g/hL in 400-1000 litri di acqua (0,8 kg/ha), effettuando fino a un massimo di 3 trattamenti per stagione a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino a tre settimane prima della raccolta. Non distanziare i trattamenti tra loro meno di 10 o più di 14 giorni.

**LATTUGHE E ALTRE INSALATE in campo comprese foglie e germogli di Brassicacee; SPINACI E SIMILI in campo; CAVOLI A INFIORESCENZA E A TESTA (Cavolfiore, Cavolo broccolo, Verza) in campo; CAVOLETTO DI BRUXELLES in campo:** contro Peronospora (*Bremia lactucae*, *Hyaloperonospora brassicae*), impiegare 80-200 g/hL in 400-1000 litri di acqua (0,8 kg/ha), effettuando fino a un massimo di 3 trattamenti per stagione a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino a tre settimane prima della raccolta. Non distanziare i trattamenti tra loro meno di 10 o più di 14 giorni.

**Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

## GESTIONE DELLE RESISTENZE

Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare **KASKO MET** a prodotti aventi differente meccanismo d'azione.

## SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

### ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO